

## Je gère et je stocke mon aliment

### Lors des livraisons d'aliment, je vérifie les points suivants:

#### Le transporteur:

- Respecte les précautions sanitaires lors de la livraison
- Porte une tenue spécifique en cas de situation de crise sanitaire, non utilisée en routine

#### Les camions d'aliment

- Je vérifie visuellement leur état de propreté avant leur entrée sur l'exploitation
- Ont accès aux silos par l'extérieur de l'unité de production et ne circulent pas sur les parcours destinés aux animaux

#### L'aliment livré

- Est conforme à la commande
- Je vérifie visuellement sa qualité: aspect, odeur, couleur, absence de nuisible et de corps étrangers



### J'enregistre les données liées à la livraison, et consigne les documents suivants :

- Dates des livraisons et quantités livrées ou reprises
- Composition des aliments et espèces destinataires
- Factures, bons de livraison ou registre de fabrication
- Identification du silo d'entreposage

### Je m'assure de la bonne distribution de l'aliment à mes animaux :

- Par un entretien des circuits de distribution (maintien de l'appétence, qualités sanitaires et nutritionnelles)
- Je protège mes points d'abreuvement et d'alimentation pour éviter les souillures
- Je ramasse régulièrement les résidus d'aliment pour éviter d'attirer les oiseaux et autres nuisibles
- Pour les animaux alimentés en extérieur, les dispositifs de distribution de l'aliment doivent être couverts d'un toit pour éviter l'accès à l'aliment par la faune sauvage. Ces dispositifs doivent être facilement nettoyables et désinfectables y compris au niveau de leur aire d'installation

### Je protège mon stock d'aliment fin de bande contre les risques de contact/contamination (oiseaux, faune sauvage, nuisibles)

- Je stocke l'aliment hors silo dans des sacs fermés dans une zone propre, sèche, à l'abri de l'humidité, des cadavres, des nuisibles et de tout risque de contaminant
- Je m'assure qu'il n'y a pas d'aliment sur et sous les silos car cela attire les nuisibles et les oiseaux sauvages
- Je renforce la dératisation au niveau de la zone de stockage de l'aliment
- Je ne dois pas réutiliser mes conditionnements (sacs, big bags...) pour un autre usage en élevage

### En fin de stock

- Je contrôle l'étanchéité de mes silos
- Je nettoie l'intérieur des silos et je désinfecte par une bougie fumigène fongicide et bactéricide ou par thermonébulisation avec un produit fongicide et bactéricide (cf cahier des charges) et j'attends leur séchage avant remplissage
- Je réalise un état des stocks d'aliment dans les silos et j'enregistre lorsque les silos sont vides (point zéro) de façon à maîtriser tout risque de contamination